

LEITURA DA RESPOSTA DA TELECONSULTORIA

1. Ao acessar a Plataforma, clique em **CENTRAL DE SOLICITAÇÕES**, e depois em **SOLICITAÇÃO**. Ao lado direito da página, você verá abaixo um quadro com uma lista de todas as suas Teleconsultorias realizadas. Procure o status **RESPOSTA DISPONÍVEL**, e depois, clique na **LUPA**.

Solicitação

Novo Solicitação

Filtros

Status: Seleccione
Serviço: Seleccione
Número: Seleccione
Descrição: Seleccione
Nome Paciente: Seleccione

Filtrar

Número	Categoria	Serviço	Descrição	Status	Paciente	Ações
51980	Teleconsultoria	Texto	GESTANTE COM 32 SEMANAS APRESENTOU RESULTADO DE...	Resposta Disponível	Glárys	🔍
51978	Teleconsultoria	Texto	Qual o músculo indicado para administração de P...	Finalizada	N/A	🔍
51976	Teleconsultoria	Texto	Vacina BCG	Devolvida ao Solicitante	N/A	🔍
51975	Teleconsultoria	Texto	Qual o músculo indicado para administração de P...	Resposta Disponível	N/A	🔍
51967	Teleconsultoria	Texto	Bom dia, sou enfermeira e gostaria de material ...	Cancelada	N/A	🔍

2. Após clicar na **LUPA**, vão aparecer os menus **RESPOSTA**, **SOLICITAÇÃO** e **ANEXO**.

a) **RESPOSTA**, é a informação enviada pelo Teleconsultor. b) **SOLICITAÇÃO** é a sua pergunta com informações detalhadas do processo. c) **ANEXO** são documentos (caso haja material disponível) encaminhados pelo Teleconsultor para complementação da resposta. Veja os exemplos abaixo:

a) RESPOSTA

← Voltar ✓ Avaliar

Resposta **Solicitação** Anexo

Resposta direta

De acordo com a indústria farmacêutica, a administração IM com Penicilina Benzatina em lactentes e crianças pequenas, pode ser preferível a face lateral da coxa. Para doses repetidas, recomenda-se variar o local da injeção*. Caso tenha mais alguma dúvida, solicite nova Teleconsultoria! AbraSUS!

Complementação

⚠ Vale ressaltar que, o tratamento da sífilis congênita no período neonatal (menor de 28 dias), de acordo com a situação clínico laboratorial, deve ser com a Penicilina cristalina, na dose de 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 dias de vida) e a cada 8 horas (após 7 dias de vida), durante 10 dias; OU Penicilina G procaína 50.000 UI/kg, dose única diária, IM, durante 10 dias. E no período pós-neonatal proceder ao tratamento segundo preconizado, observando-se o intervalo das aplicações que, para a penicilina cristalina, deve ser de quatro em quatro horas, e para a penicilina G procaína, de 12 em 12 horas, mantendo-se os mesmos esquemas de doses recomendados.

Referências

- 1- MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fta_bula/frmVisualizarBula.asp pNuTransacao=10812732015&pldAnexo=2994854. Acesso em: 12 de junho de 2018.
- 2- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.
- 3-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015.

Sumário evidências

Grau A: Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência.

Estratégia de busca

Sífilis congênita

Intenção de encaminhar para especialista?	Sim
Especialidade solicitada	Médico ginecologista e obstetra
Mantém ou Sugeri o encaminhamento?	Sim
Especialidade sugerida	Médico ginecologista e obstetra

- A** – Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência;
- B** – Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência;
- C** – Relatos de casos estudos não controlados;
- D** – Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou modelos animais.

b) SOLICITAÇÃO

← Voltar ✓ Avaliar

Resposta Solicitação Anexo



GESTANTE COM 32 SEMANAS APRESENTOU RESULTADO DE TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA SÍFILES E NÃO REAGENTE PARA VDRL. FOI REALIZADO TRATAMENTO COMPLETO EM 3 SEMANAS COM BENZETACIL 2.400.000 UI POR SEMANA, POIS A MESMA NÃO PODE FAZER O VDRL QUANTITATIVO OU O FTA-ABS PARA FECHAMENTO DO DIAGNOSTICO. O MARIDO REALIZOU A TESTAGEM RÁPIDA APRESENTANDO NEGATIVO NO RESULTADO. GOSTARIA DE SABER SE O MARIDO DEVE SER TRATADO MESMO NÃO APRESENTANDO RESULTADO POSITIVO PARA SÍFILES? LEMBRANDO QUE NENHUM REALIZOU OUTRO EXAME COMPLEMENTAR. ESTAMOS QUERENDO REALIZAR O TRATAMENTO, POIS PENSAMOS NA TEORIA DE MELHOR PECAR POR EXCESSO DO QUE NÃO TRATAR. O QUE VOCÊS TEM DE MATERIAL SOBRE ISSO. Obrigada!

Processo

Detalhes		Encaminhamento		Paciente	
Status atual	Resposta Disponível	Paciente Específico	Sim	CNS	N/A
Data de criação	12/09/2018 15:58:39	Intenção de encaminhar para especialista?	Sim	CPF	N/A
Tempo decorrido	0:1:47	Encaminhamento já solicitado	Não	Nome	Gladys
Categoria	Teleconsultoria	Especialidade solicitada	Médico ginecologista e obstetra	Nome da mãe	N/A
Serviço	Texto			Data de nascimento	N/A
				Sexo	N/A

c) ANEXO

← Voltar ✓ Avaliar

Resposta Solicitação Anexo

– Arquivo

Arquivo	Usuário	Data de envio	Download
Nenhum resultado encontrado!			

3. Finalizou a leitura da sua Teleconsulta? Então chegou a hora de **AVALIAR**. A avaliação é importante para o Núcleo de Telessaúde Bahia para qualificar o grau de satisfação geral da resposta, a resolubilidade da oferta de Teleconsultorias, além de aprimorar o serviço para os profissionais da Atenção Básica. Dê sua opinião, ela é importante!

← Voltar ✓ Avaliar

Avaliação

Satisfação Geral *

Atendeu sua dúvida ? *

Houve evitação de encaminhamento?

Críticas ou sugestões

Não Informado Muito Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito Satisfeito

Não sei informar Totalmente Parcialmente Não Atendeu

Sim Não

Não precisa responder, se não houve a intenção de encaminhar na Teleconsulta.

pacientes que apresentam histórico de doença aguda e crônica para poder orientar e monitorar, assim os encaminhando rapidamente para resolução de suas pat
acolhimento, diminuiu a taxa de morbimortalidade da doença .
Longitudinalidade - O acompanhamento de pacientes é fundamental nesses casos, e após o controle da doença continuar monitorando possíveis recidivas. O aco
Coordenação do cuidado - O seguimento dos casos conjuntamente com os agentes de saúde e de endemias é muito importante.
Integralidade - Acompanhar as diversas fases desde o diagnóstico, tratamento e cura.