

TeleHans

Ações para qualificação do cuidado à pessoa com Hanseníase na APS

Hanseníase
Avaliação Neurológica
Membros inferiores

Jesângeli de Sousa Dias

Neurologista do Instituto Couto Maia/SESAB

Professora de Neurologia da FMB/UFBA

Estado da Bahia | SECRETARIA DA SAÚDE

O nervo fibular



Função:

- Motora: dorsiflexão e eversão do pé, extensão do hálux.
- Sensibilidade: parte lateral da perna e dorso no pé.
- Autonômica: suor e produção do óleo.

Fonte: WHO, 2020.

Consequências:

- Perda sensitiva no território do n. fibular.
- Pé caído, déficit da extensão do hálux e dificuldade na eversão do pé.

O nervo fibular comum

Fonte: Brasil, 2008.

Fonte: Brasil, 2008.

TeleHans

Ações para qualificação do cuidado à pessoa com Hanseníase na APS

Estado da Bahia | SECRETARIA DA SAÚDE

O nervo tibial posterior



Fonte: Brasil, 2008.

Fonte: Brasil, 2008.

Função:

- Motora: musculatura intrínseca do pé.
- Sensibilidade: região plantar.
- Autonômica: suor e produção do óleo.

Consequências:

- Perda sensitiva no território plantar.
- Déficit da abdução e adução do hálux e artelhos e flexão dos metatarsianos.



Referências:

- Lehman, Linda Faye et all. Avaliação Neurológica Simplificada. Belo Horizonte: ALM Internacional, 1997.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de prevenção de incapacidades. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de prevenção e reabilitação em hanseníase; n.1. Brasília, 2008.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Guia pratico sobre a hanseníase . Brasília : Ministério da Saúde, 2017.
- WHO. Leprosy/Hansen' Disease: Management of reactions and prevention of disabilities. Technical guidance. 2020.



TeleHans

Ações para qualificação do cuidado à pessoa com Hanseníase na APS

Estado da Bahia | SECRETARIA DA SAÚDE