

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2025.

30 DE JANEIRO - QUINTA-FEIRA, 14H.

PALESTRANTE(S)

VÂNIA REBOUÇAS BARBOSA VANDEN BROUKE
Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações – DIVEP/SESAB.

**web
PALES
TRA**

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2025




Vânia Rebouças Barbosa Vanden Broucke
Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica de
Doenças Immunopreveníveis - CIVEDI
Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP
SUvisa / SESAB



Calendários de Vacinação


- Normalizados na esfera nacional:
- **(Instrução normativa 2024* (SVS/MS))**
- Diferenças entre calendários.



Calendário Infantil de Vacinação



Criança




Obs: 3ª dose apenas se o esquema for com a vacina Pfizer



Calendário Infantil de Vacinação



Criança



15
Meses

DTP
VIP
Hepatite A
Tetra Viral

4
Anos

Febre Amarela
DTP
Varicela

05
Anos

Pneumo 23*

***Obs: Para a população indígena a partir de 5 anos de idade, sem histórico vacinal com vacinas pneumocócicas conjugadas.**



Vacina BCG

Criança



BCG
Hepatite B

Vacina BCG (Bacilo Calmette-Guerin)

Composição	Bacilo Vivo Atenuado.
Prevenção	Formas graves de Tuberculose miliar e meníngea.
Esquema Básico	Dose única
Idade	Ao nascer
Via de Administração	Intradérmica
Dose	0,1 mL ou 0,05 mL a depender do laboratório (FAP ou SERUM)
Contra Indicação	Peso Inferior a 2 kg; Lesões graves de pele; Imunodeficiência (avaliar)



O PNI não indica a revacinação com BCG em crianças que não desenvolveram a cicatriz após a vacinação indicada ao nascimento.

Nota Informativa
nº 10/2019

Vacina Hepatite B



Criança



Ao
Nasce
r

BCG
Hepatite B

Vacina Hepatite B

Composição	Antígeno de superfície do vírus purificado
Prevenção	Hepatite B
Esquema Básico	Três doses
Idade	Uma dose ao nascer + 3 doses de pentavalente (< de 5 anos)
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL 1,0mL (> 16 ou 20 anos, conforme laboratório produtor)
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior Não deve ser aplicada na região glútea



Vacina Meningocócica C



Criança



3 e 5
Meses

Meningite C

Vacina Meningocócica Conjugada C

Composição	Polissacarídeos capsulares purificados da <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C
Prevenção	Doença sistêmica causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C
Esquema Básico	Duas doses: 3 e 5 meses e 01 reforço aos 12 meses até 4 anos.
Idade	A partir dos 3 meses
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior

Vacina Rotavírus



Criança



Rota
Pneumo 10

Vacina Rotavírus (VORH)	
Composição	Rotavírus humano atenuado da cepa RIX 4414
Prevenção	Gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1
Esquema Básico	Duas doses: 2 e 4 meses
Idade	D1: de 1m e 15d até 11m e 29 dias D2: de 3m e 15d até 23m e 29 dias
Via de Administração	Oral
Dose	1,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior Imunodepressão severa Histórico de invaginação intestinal Fora da faixa etária preconizada

Vacina Pneumocócica



Criança



Rota
Pneumo 10

Vacina Pneumocócica 10 Valente

Composição	Conjugado de <i>Streptococcus pneumoniae</i> tipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F e proteína D de <i>Haemophilus influenzae</i>
Prevenção	Infecções causadas pelos sorotipos contidos na vacina (otites, pneumonias etc)
Esquema Básico	Duas doses (2 e 4 meses) e 01 reforço aos 12 meses até 4 anos.
Idade	A partir dos dois meses
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior

Vacina Pentavalente

Criança



Penta
Polio
Influenza

Vacina Pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B)

Composição

Toxóide diftérico e tetânico; Células inteiras de *Bordetella pertussis* inativada; Antígeno de superfície Hepatite B (recombinante); Polissacarídeo capsular de *Haemophilus influenzae* tipo b

Prevenção

Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b

Esquema Básico

03 doses: intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.

Idade

2 , 4 e 6 meses de idade

Via de Administração

Intramuscular

Dose

0,5 mL

Contra Indicação

Crianças a partir de 7 anos; Reação anafilática em dose anterior; Convulsão até 72h após dose anterior; Episódio Hipotônico Hiporresponsivo até 48h após dose anterior; Encefalopatia aguda grave após 7 dias de dose anterior.

Vacina Poliomielite Inativada - VIP



Criança



Penta
Polio Inativada
Influenza
Covid-19

Vacina Inativada Poliomielite (VIP)/

Composição	VIP-Vírus Inativado
Prevenção	Poliomielite
Esquema Básico	VIP - 2, 4 e 6 meses e reforço com 15 meses de idade
Idade	A partir dos dois meses
Via de Administração	VIP-Intramuscular
Dose	VIP-0,5 mL
Contra Indicação	VIP: Reação anafilática em dose anterior.

Vacina Influenza




Criança



Penta
Polio Inativada
Influenza
Covid-19

INFLUENZA	
Composição	Vacina inativada trivalente, com cepas de vírus tipo A e B.
Prevenção	Infecção pelo vírus Influenza tipo A e B.
Esquema Básico	Duas doses na primeira vez em que forem vacinadas (primovacinação), com intervalo de um mês e revacinação anual.
Idade	A partir dos 6 meses.
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,25 mL para menores de 3 anos; 0,5 mL a partir de 3 anos.
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior

Vacina Febre Amarela



Febre Amarela	
Composição	Vírus vivo atenuado
Prevenção	Febre amarela
Esquema Básico	Duas doses
Idade	A partir dos 9 meses e reforço aos 4 anos de idade
Via de Administração	Subcutânea
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior; Menores de 6 meses; ATENÇÃO (requer avaliação de profissional de saúde): Gestantes; Mulheres que estejam amamentando crianças de até 6 meses; Maiores de 60 anos.

Vacinas Tríplice Viral, Tetraviral e Varicela



Criança



15
Meses

Tetraviral ou SCR + Varicela
Tríplice bacteriana – DTP
Hepatite A

Tríplice Viral (SCR); Tetra Viral (ou SCR + Varicela) e Varicela

Composição	SCR - Vírus vivos atenuados do sarampo, caxumba e rubéola SCRV - Vírus vivos atenuados do sarampo, caxumba, rubéola e varicela Varicela - Vírus vivos atenuados de varicela
Prevenção	SCR - Sarampo, caxumba e rubéola SCRV - Sarampo, caxumba, rubéola e varicela Varicela - Varicela
Esquema Básico	Primeira dose com SCR aos 12 meses de idade , segunda dose com SCR (ou SCR + Varicela) e ainda segunda dose de varicela (a partir de 4 anos até 6a11m e 29d)
Idade	SCR a partir dos 12 meses SCRV a partir dos 15 meses Varicela - segunda dose até 6a11m e 29d
Via de Administração	Subcutânea
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior; Gestantes; Imundeficiência.

Vacina Tríplice Bacteriana DTP



Criança



15
Meses

Tetraviral ou SCR + Varicela
Tríplice bacteriana – DTP
Hepatite A

Tríplice Bacteriana - DTP

Composição	Toxóide diftérico e tetânico; Células inteiras de <i>Bordetella pertussis</i> inativada
Prevenção	Difteria, Tétano e coqueluche
Esquema Básico	Dois reforços
Idade	Aos 15 meses e segundo reforço aos 4 anos
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Crianças a partir de 7 anos Reação anafilática em dose anterior Convulsão até 72h após dose anterior Episódio Hipotônico Hiporresponsivo até 48h após dose anterior Encefalopatia aguda grave após 7 dias de dose anterior

Vacina Hepatite A



Criança



Tetraviral ou SCR + Varicela
Tríplice bacteriana – DTP
Hepatite A

Hepatite A

Composição	Vírus inativado da hepatite A
Prevenção	Hepatite A
Esquema Básico	Dose única
Idade	Aos 15 meses e até menores de 5 anos
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior

Calendário de Vacinação do Adolescente

web
PALES
TRA

Adolescente



10 a
14
anos

Dengue

9 a
14
anos

HPV

11 a
14
anos

Meningo ACWY

10 a
19
Anos

Hepatite B
Febre Amarela
Dupla Adulto
Tríplice Viral

Calendário de Vacinação do Adolescente

web
PALES
TRA

IDADE	VACINA	PREVENÇÃO	DOSE
Meninas e Meninos de 9 a 14 anos	HPV	Papilomavírus humano que causa cânceres e verrugas genitais	01 dose Obs: Para vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos a recomendação é de duas doses. De 15 a 45, a recomendação é de três doses, considerando o histórico vacinal contra o HPV.
11 a 14 anos	Meningocócica ACWY	Doença Meningocócica ACWY	Dose única ou reforço de acordo com a situação vacinal
10 a 19 anos	Hepatite B	Hepatite B	03 doses de acordo com a situação vacinal
	Febre Amarela	Febre Amarela	Depende da situação vacinal encontrada. Não administrar se já tem duas doses ou registro de dose com idade a partir de 05 anos. Administrar dose única se nunca tiver sido vacinado ou sem comprovação, ou ainda dose de reforço se D1 foi administrada com idade inferior a 5 anos. Resumindo: Se primeira dose foi administrada com menos de 5 anos de idade, o esquema deve ter uma dose de reforço; Se a dose foi administrada após os cinco anos de idade, esquema está mantido em dose única;
	Dupla Adulto	Difteria e Tétano	03 doses de acordo com a situação vacinal e um reforço a cada 10 anos, em caso de ferimentos graves a cada 5 anos.
	Tríplice Viral	Sarampo, Caxumba e Rubéola	02 doses a depender da situação vacinal anterior

Vacinas HPV e Meningite ACWY

HPV		Meningite ACWY	
Composição	Vírus inativado das proteínas L1 dos papilomavírus humano (HPV) tipos 6,11,16,18	Composição	Polissacarídeos capsulares purificados da <i>Neisseria meningitidis</i> dos sorogrupos ACWY
Prevenção	HPV	Prevenção	Doença sistêmica causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> dos sorogrupos ACWY
Esquema Básico	01 dose	Esquema Básico	Dose única (independentemente de ter recebido anteriormente a vacina MenC (conjugada)
Idade	Meninos e meninas de 09 a 14 anos	Idade	11 a 14 anos
Via de Administração	Intramuscular	Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL	Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior Gestantes.	Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior Gestantes e mulheres que estejam amamentando (requer avaliação do risco benefício)

*Pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados e oncológicos:
Idade 9 a 45 anos;
Esquema de 3 doses (0,2,6m)

Calendário de Vacinação dos Adolescentes

web
PALES
TRA

Dupla Adulto	
Composição	Vacina inativada, contém toxóides diftérico e tetânico.
Prevenção	Difteria e Tétano
Esquema Básico	03 doses de acordo com a situação vacinal e um reforço a cada 10 anos
Idade	A partir de 07 anos
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior



Calendário de Vacinação dos Adolescentes

web
PALES
TRA

DENGUE*	
Composição	Cada dose de 0,5 mL contém: ■ Sorotipo 1,2,3 e 4 do vírus da dengue (vivo, atenuado)
Prevenção	Dengue
Esquema Básico	02 doses com intervalo de três meses entre as doses
Idade	10 a 14 anos
Via de Administração	Subcutânea
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior; Indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida Indivíduos com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática quando acompanhada por evidência de função imunológica comprometida; Mulheres grávidas ou em período de amamentação.



*Obs: Apenas 125 municípios da Bahia estão aplicando a vacina dengue



Calendário de Vacinação



Adulto



20 a
59
anos

Hepatite B
Febre Amarela
Tríplice Viral
Dupla Adulto

Gestante



Todas
as
idades

Hepatite B
Dupla Adulto
dTpa
Influenza
Covid-19

Idoso



60
anos
ou
Mais

Hepatite B
Febre Amarela
Tríplice Viral
Dupla Adulto
Influenza
Pneumo 23

Calendário de Vacinação dos Adultos

IDADE	VACINA	PREVENÇÃO	DOSE
	Hepatite B	Hepatite B	03 doses de acordo com a situação vacinal
	Febre Amarela	Febre Amarela	Depende da situação vacinal encontrada. Não administrar se registro de dose com idade a partir de 05 anos. Administrar dose única se nunca tiver sido vacinado ou sem comprovação, ou ainda dose de reforço se D1 foi administrada com idade inferior a 5 anos.
	Dupla Adulto	Difteria e Tétano	03 doses de acordo com a situação vacinal e um reforço a cada 10 anos
	Tríplice Viral	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Até 29 anos - 02 doses a depender da situação vacinal anterior 30 a 59 anos - 01 dose a depender da situação vacinal anterior

Calendário de Vacinação da Gestante



GESTANTES	VACINA	PREVENÇÃO	DOSE
	Hepatite B	Hepatite B	03 doses de acordo com a situação vacinal
	Dupla Adulto	Difteria e Tétano	03 doses de acordo com a situação vacinal e um reforço a cada 10 anos
	dTpa	Difteria, Tétano e Coqueluche	Uma dose a cada gestão a partir da 20ª semana de gestação ou até 45 dias após o parto
	Covid-19	Covid-19	Para as gestantes a recomendação é o recebimento de uma dose em qualquer momento da gestação e em cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.
	Influenza	Influenza	Uma dose na campanha anual

Além da vacina Covid-19

Calendário de Vacinação da Gestante

web
PALES
TRA



dTpa	
Composição	Vacina inativada, contém toxóides diftérico, tetânico e componentes da cápsula da bactéria da coqueluche.
Prevenção	Difteria, Tétano e Coqueluche
Esquema Básico	Uma dose a cada gestão a partir da 20ª semana de gestação ou até 45 dias após o parto
Idade	Independente da idade da gestante
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior

Calendário de Vacinação dos Idosos

web
PALES
TRA

IDADE	VACINA	PREVENÇÃO	DOSE
60 anos e mais 	Hepatite B	Hepatite B	03 doses de acordo com a situação vacinal
	Febre Amarela	Febre Amarela	Dose única se nunca tiver sido vacinado ou sem comprovação (requer avaliação do risco benefício)
	Dupla Adulto	Difteria e Tétano	03 doses de acordo com a situação vacinal e um reforço a cada 10 anos
	Influenza	Influenza	Uma dose na campanha anual
	Pneumocócica 23 Valente	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	Uma dose a partir de 60 anos de idade, sem comprovação vacinal e, cinco anos depois, fazer uma única dose adicional. A vacina pneumocócica 23 está indicada para grupos-alvo específicos.

Calendário de Vacinação dos Idosos



Pneumocócica 23 Valente*	
Composição	Vacina inativada, composta de partículas purificadas (polissacarídeos) das cápsulas de 23 tipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Prevenção	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo
Esquema Básico	Uma dose a partir de 60 anos de idade, sem comprovação vacinal e, cinco anos depois, fazer uma única dose adicional. A vacina pneumocócica 23 está indicada para grupos-alvo específicos
Idade	A partir de 60 anos
Via de Administração	Intramuscular
Dose	0,5 mL
Contra Indicação	Reação anafilática em dose anterior

***Para indígenas, a partir de 05 anos de idade.**

VACINA COVID-19



VACINAS COVID-19 EM USO NO BRASIL

❖ Vacina covid-19-RNA_m, Moderna (Spikevax)

A vacina contém RNA mensageiro (RNA_m) de cadeia simples, com estrutura Cap-5', produzida utilizando transcrição in vitro em um sistema livre de células a partir dos moldes correspondentes de DNA, que codifica a proteína S (spike) do vírus SARSCoV-28 .



Vacina Covid-19-RNA_m,
Moderna (Spikevax)

❖ Vacina covid-19-RNA_m, Pfizer (Comirnaty)

A vacina contém RNA mensageiro (RNA_m) de cadeia simples, com estrutura Cap-5', produzida utilizando transcrição in vitro em um sistema livre de células a partir dos moldes correspondentes de DNA, que codifica a proteína S (spike) do vírus SARSCoV-28 .



Vacina Covid-19- RNA_m,
Pfizer (Comirnaty)



Vacina Covid-19-recombinante,
Serum/Zalika

❖ Vacina covid-19-recombinante, Serum/Zalika

A vacina contém proteína S (spike) do SARS-CoV-2 associada ao adjuvante Matrix-M produzida por tecnologia de DNA recombinante. A vacina mostrou ser bem tolerada e eficaz, com um perfil de segurança adequado em pessoas com 12 anos de idade ou mais.

Esquema vacinal recomendado

Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)



- Crianças não vacinadas ou que nunca receberam alguma dose de vacinas Covid-19 deverão receber **duas doses** da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax). O esquema primário deverá ser com o mesmo imunizante (Quadro 2).
- Crianças com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais (vacinas CoronaVac ou Pfizer pediátrica) deverão completar o esquema com a vacina disponível (ver esquemas recomendados no Apêndice 3).
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **imunocomprometidas** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **duas doses** da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias **imunocomprometidas** que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de **três doses** da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax). O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **com comorbidades** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **uma dose anual** da vacina atualizada.

Criança



6m a
< de 5
anos

Covid-19-RNAm, Moderna
Covid-19-RNAm, Pfizer

Quadro 2. Recomendações da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), de acordo com a idade e o histórico de vacinação prévia para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias sem vacinação prévia

Idade(s)	Dose	Intervalo entre as doses
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, SEM VACINAÇÃO PRÉVIA.	Duas doses de 0,25 mL cada, administradas por via intramuscular.*	Administrar a segunda dose quatro semanas após a primeira dose.

Fonte: modificado de Anvisa. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2024/anvisa-aprova-registro-da-vacina-spikevax-monovalente>.

*Não utilizar o frasco-ampola de dose única para administrar um volume parcial de 0,25 mL.



SECRETARIA
DA SAÚDE

Esquema vacinal recomendado

Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)



- Crianças não vacinadas ou que nunca receberam alguma dose de vacinas covid-19 deverão receber **três doses** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty). O esquema primário deverá ser com o mesmo imunizante (Quadro 3).
- Crianças com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais (vacinas CoronaVac ou Pfizer pediátrica) deverão completar o esquema com a vacina disponível (ver esquemas recomendados no Apêndice 2).
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **imunocomprometidas** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **duas doses** da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias **imunocomprometidas** que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de **três doses** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty). O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **com comorbidades** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **uma dose anual** da vacina atualizada.



- Os esquemas primários deverão ser feitos priorizando o uso do mesmo imunizante do início de esquema (esquemas homólogos).
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade que não completaram o esquema primário dentro desse período, ao completarem 5 anos de idade serão considerados vacinados e terão seu esquema encerrado se tiver pelo menos uma dose.

Quadro 3. Recomendações da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty), de acordo com a idade e o histórico de vacinação prévia para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias sem vacinação prévia

Idade(s)	Dose	Intervalo entre as doses
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, SEM VACINAÇÃO PRÉVIA.	Três doses de 0,2 mL cada, administradas por via intramuscular.	Administrar a segunda dose quatro semanas após a primeira dose. Administrar a terceira dose oito semanas após a segunda dose.

Fonte: adaptado das informações presentes na bula da vacina Comirnaty®, Pfizer:
https://www.pfizer.com.br/files/Comirnaty_Profissional_de_Saude_69.pdf

Idoso



Covid-19

- **Público elegível**

Será considerada toda a população **a partir de 60 anos de idade**, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação do Idoso.

- **Meta de vacinação**

O DPNI definiu a **meta de 90%** para pessoas a partir de 60 anos de idade. Serão consideradas para fins de cálculo de indicador de cobertura vacinal as doses administradas em todas as pessoas a partir de 60 anos, por faixa etária divididas pelo número de pessoas com 60 anos e mais, segundo o censo do IBGE.

- **Vacinas e especificações técnicas**

Para a população a partir de 60 anos de idade estão disponíveis três vacinas contra a covid-19:

- 1) vacina Covid-19-RNA, Moderna (Spikevax);
- 2) vacina Covid-19- RNA, Pfizer (Comirnaty);
- 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

- **Esquema vacinal recomendado**

Para a população a partir de 60 anos de idade a recomendação é o recebimento de **uma dose** a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

Gestante



Covid-19

- **Público elegível**
Serão consideradas todas as gestantes, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação da Gestante.
- **Meta de vacinação**
O DPNI definiu a meta de 90% para gestantes. Serão consideradas para fins de cálculo de indicador de cobertura vacinal as doses administradas divididas pelo número de nascidos vivos do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivo (Sinasc).
- **Vacinas e especificações técnicas**
Para gestantes com idade inferior a 12 anos estão disponíveis duas vacinas contra a covid-19:
 - 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax);
 - 2) vacina Covid-19- RNAm, Pfizer (Comirnaty).
 Para gestantes com idade a partir de 12 anos estão disponíveis três vacinas contra a covid-19:
 - 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax);
 - 2) vacina Covid-19- RNAm, Pfizer (Comirnaty);
 - 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.
- **Esquema vacinal recomendado**
Para as gestantes a recomendação é o recebimento de uma dose em qualquer momento da gestação e em cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA OS GRUPOS ESPECIAIS

web
PALES
TRA



- A vacinação dos **GRUPOS ESPECIAIS** para covid-19 deverá ser realizada em **qualquer sala de vacina** da rede pública e **NÃO** precisará de validação médica ou externa.

Crianças a partir de 5 anos de idade que **NÃO** fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas (nenhuma dose de vacinas covid-19) poderão receber **UMA DOSE** de vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária.

- Público elegível**

São considerados para vacinação especial contra a covid-19 pessoas com 5 anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade (ex.: acesso insuficiente ao serviço de saúde) ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença. Por isso, essas populações têm indicação de dose anual (ou a cada seis meses, dependendo do grupo), independentemente do número de doses prévias de vacinas covid-19.

- Meta de vacinação**

O objetivo principal da vacinação dos grupos especiais é reduzir casos graves e óbitos por covid-19. Considerando a indisponibilidade de denominadores para os referidos grupos, não é possível definir meta de cobertura vacinal, por isso serão disponibilizados os dados de doses aplicadas (Nota Técnica no 101/2024 – DPNI/SVSA/MS)12.

- Esquema vacinal recomendado para pessoas que fazem parte do grupo especial**

- ✓ **PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS DE 5 a 11 ANOS DE IDADE;**
- ✓ **PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE;**
- ✓ **PESSOAS IMUNOCOMPROMETIDAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE;**

Referências



INSTRUÇÃO NORMATIVA DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2024;

NOTA TÉCNICA Nº 114/2022-DEIDT/SVS/MS;

ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MINISTÉRIO DA SAÚDE Brasília DF 2024 VENDA PROIBIDA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2ª edição;

INFORME TÉCNICO-OPERACIONAL ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE | 2024;

NOTA TÉCNICA Nº 193/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS;

NOTA TÉCNICA Nº 41/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS.





Obrigada!



NÚCLEO TELESSAÚDE BAHIA

Secretaria da Saúde, 4ª Avenida, 400, Centro
Administrativo da Bahia/CAB, 1º andar -
Salvador/BA. Tel.: 3115-9650

