



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CENTRO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA**

**PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO CEDEBA AO
HOSPITAL METROPOLITANO PARA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA**

1. Finalidade

A cirurgia plástica reparadora tem como objetivo a correção de deformidades anatômicas e/ou funcionais decorrentes do excesso cutâneo secundário à perda ponderal significativa tratamento clínico ou cirúrgico da obesidade.

2. Indicação Clínica (devidamente documentada)

São consideradas indicações para encaminhamento:

- Limitação de mobilidade;
- Dermatites recorrentes ou refratárias;
- Dificuldade na higiene pessoal;
- Alterações posturais;
- Repercussões funcionais, psicológicas e sociais relevantes.

3. Critérios Complementares para Elegibilidade

O paciente deverá preencher todos os critérios abaixo:

- Estabilidade ponderal por, no mínimo, 12 meses;
- Índice de Massa Corporal (IMC) entre 32 e 35 kg/m², estável;
- Controle metabólico adequado (HbA1c < 7%);
- Ausência de tabagismo;
- Ausência de metrorragia no menacme;
- Avaliação de risco cirúrgico cardiovascular realizada pela cardiologia;
- Acompanhamento regular com equipe multidisciplinar (intervalo mínimo semestral);
- Estado clínico-nutricional adequado, vide parâmetros laboratoriais mínimos (item 5.1)

4. População-Alvo

- Pacientes com perda ponderal significativa após cirurgia bariátrica;
- Pacientes com perda ponderal após tratamento clínico (avaliar individualmente).

5. Exames Laboratoriais e Complementares Obrigatórios

5.1 Parâmetros laboratoriais mínimos

- Hemoglobina/Hematócrito: Hb > 11,5 g/dL
- Ferro sérico ≥ 150 µg/dL
- Ferritina ≥ 50 ng/mL
- Albumina > 3,9 g/dL
- Vitamina B12 > 450 pg/mL
- 25-OH Vitamina D > 30 ng/mL
- AST (TGO), ALT (TGP), coagulograma, ureia, creatinina e sódio dentro dos limites de normalidade



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CENTRO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA

5.2 Exames de imagem

- Doppler colorido de membros inferiores;
- Ultrassonografia de abdome total;
- Ultrassonografia de parede abdominal.